

	Control	Antisepsia	P
Sujetos (n)	48	52	
Número de drenajes	58	67	
N° de sujetos con 2 drenajes (%)	10 (21%)	15 (29%)	0,36
N° de sujetos con drenaje axilar (%)	13 (27%)	18 (35%)	0,42
Edad, años, media (rango)	61,6 (39-84)	61,5 (32-82)	0,96
IMC, media (rango)	27,8 (16-45)	27,3 (15-42)	0,65
Clase ASA, n (%)			0,24
I	5 (10%)	10 (19%)	
II	37 (77%)	37 (71%)	
III	5 (10%)	5 (10%)	
IV	1 (2%)	0	
Quimioterapia neoadyuvante, n (%)	9 (19%)	7 (13%)	0,47
Radioterapia previa, n (%)	4 (8%)	3 (6%)	0,62
Tabaco en las 4 semanas preoperatorias, n (%)	4 (8%)	4 (8%)	0,91
Operación, n (%)			0,28
Lumpectomía/disección axilar	3 (6%)	1 (2%)	
Mastectomía	5 (10%)	5 (10%)	
Mastectomía + ganglio centinela	29 (60%)	27 (52%)	
Mastectomía radical modificada	11 (23%)	17 (33%)	
Disección axilar	0	2 (4%)	
Preparación preoperatoria de la piel, n (%)			0,97
Alcohol/clorhexidina	38 (79%)	41 (79%)	
Alcohol/iodo	10 (21%)	11 (21%)	
Tiempo operatorio, horas:minutos			0,56
Media	2:28	2:34	
Mediana	2:17	2:27	
Rango	1:12-5:13	1:14-4:45	
DPO de remoción del drenaje			0,15
Media	8,2	9,1	
Mediana	7	7	
Rango	5-16	4-19	
Volumen 24 hs drenaje a la 10 semana, mL			0,44
Media	26,6	29,6	
Mediana	23	24	
Rango	5-65	3-136	
Volumen 24 hs drenaje antes de remoción, mL			0,81
Media	20,5	20,1	
Mediana	19	19	
Rango	5-57	3-45	